

## Cyracid 2.0

### *Granulát na hubení muších larev*



- Přípravek můžete použít také v obsazených stájích
- Žádné rezistence

**Vlastnosti:**

**Cyracid 2.0** je ve vodě rozpustný granulát na hubení muších larev. Obsahuje účinnou látku cyromazine, která přeruší vývojový cyklus much, ale nemá vliv na hubení dospělých much. Cyracid 2.0 se používá pro likvidaci všech druhů muších larev, jako jsou larvy mouchy domácí, larvy ovádů, larvy pestřenky trubcové - Eristalis tenax a jiných larev, které se vyvíjejí v hnoji nebo v podestýlce chovu skotu, telat, prasat nebo drůbeže. Přípravek můžete aplikovat formou rozptýlu, polití pomocí kropicí konve nebo formou postřiku pomocí zádového postřikovače. Aplikujte hlavně na líhniště much, jako je hnůj, podestýlka atd. Po 10 až 20 dnech po první aplikaci se populace much významně sníží.

**Cílový organismus:**

pro likvidaci všech druhů muších larev (larvy mouchy domácí, larvy ovádů, larvy pestřenky trubcové - Eristalis tenax a jiných larev, které se vyvíjejí v hnoji nebo v podestýlce)

**Oblast použití:**

Chov skotu, telat, prasat a drůbeže a jiné oblasti, kde se líhnou mouchy

**Tabulka aplikace:**

|                          | Cyracid 2.0   | + vody                              | Dostačující na m <sup>2</sup>           |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aplikace formou rozptýlu | 500 g         | --                                  | 20 m <sup>2</sup>                       |
| Aplikace formou polití   | 500 g<br>5 kg | + 15 litrů vody<br>+ 150 litrů vody | 20 m <sup>2</sup><br>200 m <sup>2</sup> |
| Aplikace formou postřiku | 500 g         | + 5 litrů vody                      | 20 m <sup>2</sup>                       |

**Návod k použití:****Aplikace**

První aplikaci proveďte 5 dní po vykydání hnoje. Podle typu aplikace, rozpusťte granulát podle výše uvedené tabulky. Zvolte formu aplikace, která je pro vás nejvhodnější. Dejte pozor, abyste ošetřili všechna místa, kde se líhnou mouchy například hnůj, hlubokou podestýlku, kejdové kanály a další. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Zvyšuje-li se objem hnoje

jen pomalu, můžete interval aplikace prodloužit na 21 dní. Po 10 až 20 dnech po první aplikaci se populace much významně sníží.

### **Spotřeba:**

#### **- Chov telat (calve breeding):**

Doporučuje se první aplikaci provést po 1-3 dnech po ustájení telat do stáje. Aplikujte přípravek přímo na hnůj. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 3 aplikace.

#### Spotřeba na 20 metrů podestýlky:

Při aplikaci formou polítky pomocí konvice:

250 g + 10 litrů vody

Při aplikaci formou postřiku pomocí zádového postřikovače: 250 g + 1 až 4 litry vody

#### **- Telecí plochy na mléčných farmách:**

Opakujte aplikaci po 14 dnech.

#### Spotřeba na 20 metrů podestýlky:

Aplikace formou polítky pomocí konvice:

250 g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádového postřikovače: 250 g + 1 až 4 litry vody

#### **- Chovné stanice skotu s roštovou podlahou**

Aplikujte přípravek rovnoměrně na celou podlahu. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 2 aplikace.

#### Spotřeba na 10m<sup>2</sup> roštové podlahy:

Aplikace formou rozptýlu: 250 g

Aplikace formou polítky pomocí konvice:

250 g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádového postřikovače: 250 g + 1 až 4 litry vody

#### **- Chov prasat s plnými a částečnými roštovými podlahami**

##### Plná roštová podlaha:

Aplikujte přípravek rovnoměrně na celou podlahu v boxu, než zvířata ustájíte. Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 2 aplikace.

##### Částečná roštová podlaha:

Aplikujte přípravek na rošty pomocí konvice nebo zádového postřikovače. Ošetřete také okrajové zóny, odpočinkové zóny, např. i plochy vedle / pod krmítkem, kde se často nachází zbytky krmiva nebo hnůj. Informace k aplikaci: viz roštová podlaha.

#### Spotřeba na 10 m<sup>2</sup>:

Aplikace formou rozptýlu: 250 g

Aplikace formou polítky pomocí konvice: 250 g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádového postřikovače: 250 g + 1 až 4 litry vody

---

### - Chov drůbeže s hlubokou jámou (baterie a stáje "flatdecks")

Aplikujte přípravek rovnoměrně na celý povrch hnoje. Nejlepších výsledků dosáhnete, když první aplikaci provedete 1 týden po vykydání hnoje (tzn. podložka hnoje by neměla být tlustší než 10 cm). Opakujte aplikaci po 14 dnech. Celkově jsou nutné 2 aplikace.

Spotřeba na 10 m<sup>2</sup>:

Aplikace formou rozptylu: 250 g

Aplikace formou políť pomocí konvice: 250 g + 10 litrů vody

Aplikace formou postřiku pomocí zádobého postřikovače: 250g + 1 až 4 litry vody

### **Poznámka:**

Upřednostněte tekutou aplikaci, pokud chcete produkt aplikovat na hlubokou podestýlku (skot, prasata, koně).

### **Účinná látka:**

20 g/kg cyromazin

### **Balení:**

1000g

5kg